

Біобезпека на господарстві


- ✓ **Не допускайте** контакт свійської птиці з дикою
- ✓ **Не зберігайте** на господарстві елементи, які можуть приваблювати диких птахів
- ✓ **Зберігайте** корм захищеним від диких птахів та гризунів, регулярно прибирайте будь-яке висипання корму
- ✓ **Забезпечте** постачання водопровідної води або води з іншого безпечного джерела
- ✓ **Зберігайте** настил захищеним від диких птахів та гризунів
- ✓ **Дотримуйтеся** суворого контролю доступу транспортних засобів, осіб та обладнання до зграй
- ✓ **Забезпечте** дезінфекцію нерухомості, пташників, обладнання, одягу та взуття
- ✓ **Уникайте** заведення птиці з невідомим статусом щодо хвороби у зграю
- ✓ **Ізольуйте** новозаведену птицю
- ✓ **Забезпечте** належну утилізацію посліду, сміття та полеглої свійської птиці




ГРИП ПТИЦІ НА КОМЕРЦІЙНИХ ГОСПОДАРСТВАХ



Цей матеріал підготовлено за фінансової підтримки Європейського Союзу. Його зміст є виключною відповідальністю Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів і не обов'язково відображає погляди Європейського Союзу



Що це таке?



ГРИП ПТИЦІ - це

висококонтагіозна вірусна хвороба, що здатна вразити і свійську, і дику птицю

ПРОЯВЛЯЄТЬСЯ В ДВОХ ФОРМАХ

НИЗЬКОПАТОГЕННИЙ - практично не викликає клінічних ознак у птиці

ВИСОКОПАТОГЕННИЙ - може викликати важкі клінічні ознаки та потенційно високий падіж птиці

Деякі штами – **ЗООНОЗНІ***
Передача людині може мати місце під час близького безпосереднього контакту з інфікованою птицею або сильно забрудненим середовищем



Хвороба може мати значний негативний вплив на **здоров'я тварин, здоров'я людей та економіку країни**

Може спричинити **високий падіж**

Підтвердження хвороби може негативно вплинути **на торгівлю** на уражених територіях

Як передається?

- ◆ Через **прямий контакт** із інфікованою свійською або дикою птицею
- ◆ Через **предмети або фоміти** (вірус здатен до виживання в середовищі протягом тривалого періоду часу)
- ◆ Виділяється **з посліду та респіраторної секречії**



Інкубаційний період хвороби **від декількох днів до 2 тижнів**



У разі підозри щодо наявності хвороби у свійської чи дикої птиці, негайно повідомте про це Держпродспоживслужбу* у вашому районі або області

*Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Сайт служби dpss.gov.ua та avianflu.vet.ua

*Зоонози - хвороби, спільні для людей і тварин